


Deficiente



Deficiente mintale

1. Tulburari de invatare (citire, memorie, rezolvare de probleme, compunere de texte.)

2. intelect de limita, debilitate, imbecilitate, idiotie.

Clasificarea :

Tipul deficientei	Coeficient de inteligenta
Deficienta mintala profunda gr.III idiotie	Q.I. 0 - 20/25
Deficienta mintala severa gr. II imbecilitate	Q.I. 20/25 - 35
Deficienta mintala usoara gr. I debilitate	Q.I. 50/55 – 70/75
Intelect de limita	Q.I. 70/75- 85

Deficiente senzoriale

1. Deficiente de auz
2. Deficiente de vaz

Hipoacuzia - diminuarea acuitatii auditive

Surditate - scaderea usoara sau grava, unilaterala sau bilaterala a acuitatii auditive.

Tipul deficientei	Gradul pierderii (decibeli, dB)
Auditie normala sau subnormala	Prag inferior valorii de 20 dB
Deficiente auditive usoare	Prag 20-40 dB
Deficiente auditive medii	Prag 40-70 dB
Deficiente auditive severe	Prag 70-90 dB
Deficiente auditive profunde	Prag superior sau egal cu 90 dB

Deficiente de vedere

- **Ambliopia** , numită și "*ochiul leneș*", este o boală a sistemului vizual caracterizată prin slăbirea simțitoare a vederii. Ambliopia este o consecință a unei dereglări a vederii binoculare, fără leziune organică. Copiii pot dezvolta ambliopie încă de la naștere, până la vârsta de 6-7 ani. Copilul cu ambliopie nu realizează că nu vede bine cu un ochi. Cu cât este diagnosticată mai devreme, cu atât șansele de tratare sunt mai crescute. Există mai multe forme de ambliopii, dar cele mai frecvente sunt ambliopiile însoțite de vicii de refracție (miopia, hipermetropia și astigmatismul) sau de strabism.
- **Cecitate vizuala.** cecitate poate fi totala sau partiala, congenitala sau dobândita. cecitatea poate fi partiala (acuitatea celui mai bun ochi este cuprinsă între 1/20 și 1/50), aproape totală (acuitatea celui mai bun ochi este cuprinsă între 1/50 și pragul de percepere a luminii) sau totală (nu se percepe deloc lumina).

Deficiente Locomotorii

- **osteomioarticulare**

- **de atitudine** – cifoza, scolioza, talpa plata
- **deficiente ale musculaturii**- hipotonii sau hipertonii
- **deficiente ale oaselor, ale articulatiilor**

- **Neurologice**

Etiologie :

accidente in timpul nasterii (de exemplu, travaliul prelungit, aplicarea forcepsului, circulara de cordon) sau

dupa nastere (icter hemolitic, encefalita, meningita, traumatisme craniene).

dobandite, tulburari vasculare ce duc la infarct cerebral ischemic sau hemoragii cerebrale, cele inflamatorii (cum sunt encefalitele, mielitele sau meningitele), cefaleea, migrena si traumatismele cranio-cerebrale si vertebro-medulare

- **monoplegia** - paralizie ce afecteaza muschii unui singur membru
- **diplegie** - paralizie ce afecteaza muschii a doua membre
- **triplegie** - paralizie ce afecteaza muschii a trei membre
- **tetraplegie** - paralizie ce afecteaza muschii ambelor maini si picioare
- **hemiplegie** - paralizia muschilor unei jumatatii de corp
- **paraplegie** - paralizia ambelor membre superioare sau inferioare

Tulburari de limbaj

Etiologia :

În timpul sarcinii (ex. diferitele intoxicații și infecții, sarcina toxică, cu varsături și leziuni dese, bolile infecțioase ale gravidei etc),

În timpul nasterii (nașterile grele și prelungite, care duc la leziuni ale sistemului nervos central, asfixierile, ce pot determina hemoragii la nivelul scoartei cerebrale, hemoragiile prelungite din timpul sarcinii etc),

după naștere (post-natale) {organice, functionale, psiho-neurologice, psihosociale, alte cauze}.

Formele :

- **Tulburari de dezvoltare a limbajului** mutismul psihogen și retardul sau întârzierea în dezvoltarea generală a vorbirii
- **Tulburari de voce** (afonia, disfonia, fonastenia)
- **Tulburari de ritm și fluent** bâlbâiala, logonevroza, tahilalia, bradilalia, aftongia).
- **Tulburari de pronunțare** (dislalie, rinolalie, dizartrie)

Polihandicapul

Surdocecitate

Acest polihandicap consta în coexistenta la aceeași persoană a două tipuri de deficiențe de ordin senzorial: deficiența de văz și deficiența de auz.

Persoana cu surdocecitate se caracterizează, adesea, prin lezarea (pierderea) celor trei canale de comunicare cu mediul: văzul, auzul și canalul verbal, fiind o persoană oarbă, surdă și mută.

Etiologie

Bolile infectocontagioase, intoxicațiile, febra tifoidă, rușeola, administrarea în exces a streptomisinei, neomicinei, kanamicinei și traumatismele care afectează zonele centrale și periferice ale analizatorilor respectivi, meningitele și encefalitele).

Autismul

Manifestările sunt:

- a) dificultăți de limbaj și comunicare;
- b) discontinuitate în dezvoltare și învățare;
- c) deficiențe perceptuale și relaționale;
- d) tulburări acționale și comportamentale;
- e) disfuncționalități ale proceselor, însușirilor și funcțiilor psihice

Acest material poate fi copiat numai cu acordul în scris al autorului.
ion.emilian@motivation-md.org